


Eigenvärden och egenvektorer (5.1-5.2)

Inledande exempel. Låt $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ vara spegling i en linje i \mathbb{R}^2 , säg $x-3y=0$



Punkter \bar{u} på linjen uppfyller

$$T(\bar{u}) = \bar{u}.$$

De avbildas på sig själva.

Punkter \bar{v} i normalriktningen uppfyller

$$T(\bar{v}) = -\bar{v}$$

De avbildas på minus sig själva.

Punkt på linjen: $\bar{u} = (3, 1)$

Punkt i normalriktningen: $\bar{v} = (1, -3)$

Definiera $B = \{ \bar{u}, \bar{v} \} = \{ (3, 1), (1, -3) \}$

Vi ser att $T(\bar{u}) = \bar{u}$, dvs $[T(\bar{u})]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$
 $T(\bar{v}) = -\bar{v}$, dvs $[T(\bar{v})]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

Detta ger att matrisen för T i basen B är

$$[T]_{B,B} = \begin{bmatrix} [T(\bar{u})]_B & [T(\bar{v})]_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Detta är mycket enklare än standardmatrisen för T .

(Denna blir $\begin{bmatrix} 4/5 & 3/5 \\ 3/5 & -4/5 \end{bmatrix}$.)

Mer allmänt exempel i \mathbb{R}^3 : Anta att $B = \{\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}\}$ är en bas i \mathbb{R}^3 , och anta att $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ har egenskapen att

$$T(\bar{u}) = \lambda_1 \bar{u}, \quad T(\bar{v}) = \lambda_2 \bar{v}, \quad T(\bar{w}) = \lambda_3 \bar{w}.$$

Då är

$$[T(\bar{u})]_B = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad [T(\bar{v})]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ \lambda_2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad [T(\bar{w})]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \lambda_3 \end{bmatrix}$$

Alltså är $[T]_{B,B} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$

Anta att vi vill studera T^N för $N \geq 1$ ($T^2 = T \circ T$, $T^3 = T \circ T \circ T, \dots$)

Vi får då att

$$[T^N]_{B,B} \stackrel{\text{räkne-regel}}{=} ([T]_{B,B})^N = \begin{bmatrix} \lambda_1^N & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2^N & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3^N \end{bmatrix}$$

T^N blir alltså enkel att studera i basen B .

sid 295:

En nollskild vektor \bar{u} är en egenvektor till n:n-matrisen A (och till motsvarande avbildning T_A) om $A\bar{u} = \lambda\bar{u}$ ($T_A(\bar{u}) = \lambda\bar{u}$) för någon skalär λ . Talet λ är egenvärdet som hör till egenvektorn \bar{u} .

Observation: Anta att $A\bar{x} = \lambda\bar{x}$. Detta kan skrivas

$$A\bar{x} = \lambda \underset{\substack{\uparrow \\ \text{enhetsmatrisen}}}{I} \bar{x} \iff (\lambda I)\bar{x} = A\bar{x} \iff (\lambda I)\bar{x} - A\bar{x} = \bar{0} \\ \iff (\lambda I - A)\bar{x} = \bar{0}$$

296-297:

Ekvationen $(\lambda I - A)\bar{x} = \bar{0}$ har en icke-trivial lösning om och endast om $\det(\lambda I - A) = 0$. Detta är den karaktéristiska ekvationen till matrisen A . $\det(\lambda I - A)$ är det karaktéristiska polynomet.

(3)

Sammanfattning: λ är ett egenvärde till A om och endast om $\det(\lambda I - A) = 0$

Exempel: Låt $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 7 \end{bmatrix}$. Bestäm A 's egenvärden, och hitta en bas av egenvektorer till A .

Lösning. Egenvärdena ges av lösningarna λ till ekvationen

$$\begin{aligned} 0 &= \det(\lambda I - A) = \det\left(\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 7 \end{bmatrix}\right) \\ &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & -1 \\ 4 & \lambda-7 \end{vmatrix} = (\lambda-2)(\lambda-7) + 4 = \lambda^2 - 9\lambda + 18 \end{aligned}$$

$$\lambda^2 - 9\lambda + 18 = 0 \Leftrightarrow \lambda = \frac{9}{2} \pm \sqrt{\frac{81}{4} - 18} = \frac{9}{2} \pm \sqrt{\frac{81-72}{4}} \\ = \frac{9}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{9}{2} \pm \frac{3}{2},$$

dvs $\lambda = 6$ eller $\lambda = 3$

Egenvektorer svarande mot egenvärdet $\lambda = 6$:

$$(6I - A) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 6-2 & -1 \\ 4 & 6-7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow 4x - y = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 4t \end{cases} \Leftrightarrow (x, y) = (t, 4t) = t(1, 4).$$

Egenvärdet $\lambda = 3$: $(3I - A) = \begin{bmatrix} 3-2 & -1 \\ 4 & 3-7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}$, så

$$(3I - A) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 4 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ 4(x - y) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = t \\ y = t \end{cases} \Leftrightarrow (x, y) = (t, t) = t(1, 1)$$

(4)

Exempelvis är $\{(1,4), (1,1)\}$ en bas av egenvektorer till A .

Kontroll: $A \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 24 \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ - egenvektor med $\lambda=6$.

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ - egenvektor med } \lambda=3$$

Studera nu ovanstående exempel. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 7 \end{bmatrix}$ är standardmatrisen för avbildningen $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ som ges av $T(x,y) = (2x+y, -4x+7y)$

I basen $B = \{\bar{u} = (1,4), \bar{v} = (1,1)\}$ har vi att

$$T(\bar{u}) = 6\bar{u} \quad \text{och} \quad T(\bar{v}) = 3\bar{v}, \quad \text{så}$$

$$[T]_{B,B} = \begin{bmatrix} [T(\bar{u})]_B & [T(\bar{v})]_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = D.$$

Låt nu \bar{w} vara en godtycklig vektor, och låt $E = \{(1,0), (0,1)\}$.

Vi har att

$$[\bar{w}]_E = P_{B \rightarrow E} [\bar{w}]_B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} [\bar{w}]_B.$$

Eftersom $[T(\bar{w})]_E = A [\bar{w}]_E (= [T]_{E,E} [\bar{w}]_E)$,

får vi att

$$\underbrace{P_{B \rightarrow E} [T(\bar{w})]_B}_{[T(\bar{w})]_E} = A \underbrace{P_{B \rightarrow E} [\bar{w}]_B}_{[\bar{w}]_E}$$

$$\Leftrightarrow [T(\bar{w})]_B = (P_{B \rightarrow E})^{-1} A P_{B \rightarrow E} [\bar{w}]_B$$

Men vi har ju även att

$$[T(\bar{w})]_B = [T]_{B,B} [\bar{w}]_B = D [\bar{w}]_B$$

vilket ger att $[T]_{B,B} = D = (P_{B \rightarrow E})^{-1} A P_{B \rightarrow E}$

(5)

I exemplet har vi $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 7 \end{bmatrix}$, $B = \{(1,4), (1,1)\}$ och

$$P_{B \rightarrow E} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}, \text{ vilket ger } (P_{B \rightarrow E})^{-1} = \frac{1}{-3} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/3 & 1/3 \\ 4/3 & -1/3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} (P_{B \rightarrow E})^{-1} A P_{B \rightarrow E} &= \begin{bmatrix} -1/3 & 1/3 \\ 4/3 & -1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1/3 & 1/3 \\ 4/3 & -1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 24 & 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

sid 307:

Allmänt resultat: Låt $B = \{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n\}$ vara en bas av egenvektorer till matrisen A . Skriv $P = P_{B \rightarrow E}$, där E är standardbasen; kolonnerna i P är vektorerna $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n$ uttryckta i standardbasen. Då är

$$P^{-1} A P = D,$$

$$\text{där } D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}, \text{ där } A \bar{v}_i = \lambda_i \bar{v}_i.$$

sid 305:

Vi säger att A är diagonaliserbar om det finns en inverterbar matris P sådan att

$$D = P^{-1} A P$$

är en diagonalmatris. Låt A vara en $n \times n$ -matris.

sid 306:

Sats A är diagonaliserbar om och endast om det finns en bas för \mathbb{R}^n bestående av egenvektorer till matrisen A .

(6)

sid 310-311: En fördel med att diagonalisera en matris A är att vi sedan lätt kan beräkna A^N för stora N . Anta nämligen att $P^{-1}AP = D$. Detta kan vi skriva om som

$$A = PDP^{-1} \quad (PP^{-1}APP^{-1} = PDP^{-1})$$

Vi ser nu att

$$A^2 = P \underbrace{DP^{-1}PD}_{=I} P^{-1} = PD^2P^{-1}$$

$$A^3 = PDP^{-1}A^2 = PDP^{-1} \underbrace{PD^2P^{-1}}_{=I} = PD^3P^{-1}$$

$$\text{Allmänt: } A^N = \underbrace{PDP^{-1}}_A \underbrace{PDP^{-1}}_A \dots \underbrace{PDP^{-1}}_A = PD^N P^{-1}$$

$$\text{Alltså: } \boxed{A^N = PD^N P^{-1}} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{N \text{ gånger}}$$

Exempel: Beräkna A^N , då $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 7 \end{bmatrix}$.

Lösning. Vi vet sedan tidigare att $P^{-1}AP = D = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, där $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$ och $P^{-1} = \begin{bmatrix} -1/3 & 1/3 \\ 4/3 & -1/3 \end{bmatrix}$. Vi får att

$$A = PDP^{-1} \Rightarrow A^N = PD^N P^{-1} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6^N & 0 \\ 0 & 3^N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/3 & 1/3 \\ 4/3 & -1/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6^N & 3^N \\ 4 \cdot 6^N & 3^N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/3 & 1/3 \\ 4/3 & -1/3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{6^N}{3} + \frac{4}{3} 3^N & \frac{6^N}{3} - \frac{1}{3} 3^N \\ -\frac{4}{3} 6^N + \frac{4}{3} 3^N & \frac{4}{3} 6^N - \frac{1}{3} 3^N \end{bmatrix}$$

sid 308: Är alla matriser diagonaliserbara? Ekvivalent: Finns det alltid en bas bestående av egenvektorer? Svar: Nej.

Exempel: $A = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$, Egenvärden ges av nollställena till det karakteristiska polynomet

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 5 & -9 \\ 1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 5)(\lambda + 1) + 9$$

$$= \lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 2)^2$$

$\det(\lambda I - A) = 0$ har som enda lösning $\lambda = 2$. Hitta egenvektorer som hör till detta enda egenvärde $\lambda = 2$:

$$[2I - A] \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -3 & -9 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -3(x+3y) = 0 \\ x+3y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3t \\ y = t \end{cases} \Leftrightarrow (x, y) = t(-3, 1).$$

De enda egenvektorerna är alltså multiplar av vektorn $(-3, 1)$. Ingen bas av egenvektorer finns alltså.

sid 299

I ovanstående exempel beräknade egenrummet till egenvärdet $\lambda = 2$. För en allmän $n \times n$ -matris A och ett egenvärde λ till A definierar vi egenrummet hörande till λ att vara lösningsmängden till ekvationen $(\lambda I - A)\bar{x} = \bar{0}$. Varje nollskild vektor i egenrummet hörande till λ är en egenvektor med egenvärde λ .

Obs: Egenrummet hörande till ett egenvärde λ är ett vektorrum.

Exempel Diagonalisera matrisen $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ genom att bestämma

en bas till varje egenrum till A .

Lösning Vi bestämmer först egenvärdena till A :

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda-2 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda-2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\oplus} \begin{vmatrix} \lambda-2 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda-2 & 1 \\ 0 & 3-\lambda & \lambda-3 \end{vmatrix} \leftarrow$$

$$= (\lambda-3) \begin{vmatrix} \lambda-2 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda-2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda-3) \left((\lambda-2)^2 + (-1) - (-(\lambda-2) - 1) \right)$$

$$= (\lambda-3) (\lambda^2 - 4\lambda + 4 - 1 + \lambda - 2 - 1) = (\lambda-3)(\lambda^2 - 3\lambda)$$

$$= (\lambda-3)(\lambda-3)(\lambda-1) = (\lambda-3)^2 \lambda$$

Två egenvärden: $\lambda = 3$ och $\lambda = 0$.

Bestäm egenrummen: $\lambda = 3$: $(3I - A) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow x+y+z=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -s-t \\ y = s \\ z = t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow (x, y, z) = (-s-t, s, t) = -s(-1, 1, 0) + t(-1, 0, 1)$$

En bas till egenrummet för $\lambda = 3$ är därmed $\{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$

$$\lambda = 0: (I - A) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & -1/2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & -3/2 & 3/2 \\ 0 & 3/2 & -3/2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & -\sqrt{2} & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Detta ger
$$\begin{cases} x - \frac{y}{2} - \frac{z}{2} = 0 \\ y - z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{y}{2} + \frac{z}{2} = \frac{t}{2} + \frac{t}{2} = t \\ y = t \\ z = t \end{cases}$$

$\Leftrightarrow (x, y, z) = (t, t, t) = t(1, 1, 1)$

En bas till egenrummet för $\lambda=0$ är därmed $\{(1, 1, 1)\}$

En bas av egenvektorer: $\{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1), (1, 1, 1)\} = B$

Bilda matrisen $P = P_{B \rightarrow E} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Vi får då att

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Diagonalelementen är 3, 3, 0, t.ex. $A \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$,

$A \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ och $A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 0 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Följdfråga: Hitta en bas av egenvektorer till A^N för varje $N \geq 1$, och diagonalisera A , där A är som i ovanstående exempel.

Lösning Om $A\bar{v} = \lambda\bar{v}$, så är $A^2\bar{v} = A(A\bar{v}) = A(\lambda\bar{v}) = \lambda A\bar{v} = \lambda^2\bar{v}$, och $A^3\bar{v} = A(A^2\bar{v}) = A(\lambda^2\bar{v}) = \lambda^2 A\bar{v} = \lambda^3\bar{v}$.

Mer allmänt:

$$A^N \bar{v} = \lambda^N \bar{v}$$

I synnerhet är $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ och $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ egenvektorer till A^N med egenvärde 3^N , medan $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ är en egenvektor med egenvärde $0^N = 0$. Med $P = P_{B \rightarrow E}$ som tidigare får vi

$$P^{-1}A^N P = \begin{bmatrix} 3^N & 0 & 0 \\ 0 & 3^N & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

sid 297:

Att lösa den karakteristiska ekvationen då A är en $n \times n$ -matris med $n \geq 3$ och alla element är heltal:

Om $\det(\lambda I - A) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + c_1\lambda + c_0$, och om $\lambda_0 \neq 0$ är ett heltal sådant att λ_0 är ett egenvärde till A , så gäller att c_0 är delbart med λ_0 .

Exempel: Låt $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -6 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$. Vi får att

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda-1 & 6 \\ 0 & 1 & \lambda+1 \end{vmatrix} = [\text{räkna på}] = \lambda^3 - \lambda^2 - 11\lambda + 3$$

Heltal som kan vara egenvärden: 3, 1, -3, -1 (ty $c_0 = +3$)

Testa: $\lambda = 3$ ger $3^3 - 3^2 - 11 \cdot 3 + 3 = 27 - 9 - 33 + 3 = -12$

$\lambda = 1$ ger $1^3 - 1^2 - 11 \cdot 1 + 3 = -8$

$\lambda = -3$ ger $(-3)^3 - (-3)^2 - 11 \cdot (-3) + 3 = -27 - 9 + 33 + 3 = 0 \leftarrow$

$\lambda = -1$ ger $(-1)^3 - (-1)^2 - 11 \cdot (-1) + 3 = -1 - 1 + 11 + 3 = 12$

Alltså är $\lambda = -3$ ett egenvärde, och $\lambda + 3$ är en faktor i polynomet:

$$\begin{array}{r} \lambda^2 - 4\lambda + 1 \\ \lambda + 3 \overline{) \lambda^3 - \lambda^2 - 11\lambda + 3} \\ \underline{\lambda^3 + 3\lambda^2} \\ -4\lambda^2 - 11\lambda \\ \underline{-4\lambda^2 - 12\lambda} \\ \lambda + 3 \\ \underline{\lambda + 3} \\ 0 \end{array} \Rightarrow \lambda^3 - \lambda^2 - 11\lambda + 3 = (\lambda + 3)(\lambda^2 - 4\lambda + 1)$$

Vi observerar nu att $\lambda^2 - 4\lambda + 1 \Leftrightarrow \lambda = 2 \pm \sqrt{2^2 - 1}$

= $2 \pm \sqrt{3}$. Egenvärdena till A är alltså

$$\lambda_1 = -3 \quad \lambda_2 = 2 + \sqrt{3} \quad \lambda_3 = 2 - \sqrt{3}$$

sid 309:

Sats Låt $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k$ vara egenvektorer till matrisen A sådana att $A\bar{v}_i = \lambda_i \bar{v}_i$, där $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ alla är olika. Då är $\{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k\}$ linjärt oberoende.

Beris då $k=2$: Anta att \bar{v}_1 och \bar{v}_2 inte är linjärt oberoende. De är då parallella, och $\bar{v}_2 = a\bar{v}_1$ för något a . Detta ger att

$$A\bar{v}_2 = A(a\bar{v}_1) \Leftrightarrow \lambda_2 \bar{v}_2 = a\lambda_1 \bar{v}_1$$

$$\text{Multiplikera } \bar{v}_2 = a\bar{v}_1 \text{ med } \lambda_2: \lambda_2 \bar{v}_2 = a\lambda_2 \bar{v}_1$$

Vi får $a\lambda_1 \bar{v}_1 = a\lambda_2 \bar{v}_1$ (båda led är lika med $\lambda_2 \bar{v}_2$), så

$$a(\lambda_1 - \lambda_2)\bar{v}_1 = 0. \quad \lambda_1 \neq \lambda_2 \text{ ger att } \lambda_1 - \lambda_2 \neq 0, \text{ så därför är } a=0.$$

Vi får alltså att $\bar{v}_2 = 0\bar{v}_1 = \bar{0}$, vilket är omöjligt; en egenvektor är alltid nollskild.

(Beriset i allmänna fallet följer samma mönster.)

Exempel: Finns det en matris A sådan att $A \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}$,
 $A \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$ och $A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$?

Lösning. Vi ser att $A \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$, $A \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$,
 så $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ är egenvektorer med tre olika egenvärden. Dock är $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, så vektorena är linjärt beroende, en motsägelse. Det finns alltså ingen matris med de givna egenskaperna.

Sats Om A är en $n \times n$ -matris med n olika ^{reella} egenvärden, så är A diagonaliserbar. Vi kan alltså bilda en bas till \mathbb{R}^n bestående av en egenvektor för varje egenvärde.

För komplexa egenvärden (t.ex. $3-4i$) blir även egenvektorerna komplexa, och dessa ligger inte i \mathbb{R}^n .

sid 312:

Låt A vara en $n \times n$ -matris, och anta att det karakteristiska polynom kan skrivas

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - \lambda_1)^{a_1} \cdot (\lambda - \lambda_2)^{a_2} \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_m)^{a_m},$$

där $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ är egenvärdena till A .

Talet a_i är den algebraiska multipliciteten för egenvärdet λ_i .

Exempel: Om $\det(\lambda I - A) = (\lambda - 7)^3 (\lambda + 11)^5 (\lambda - 4)^2$,

Så har	{	$\lambda_1 = 7$	multipliciteten	3	$n = 3 + 5 + 1 + 2 = 11$, så A är en 11×11 -matris.
		$\lambda_2 = -11$	-11-	5	
		$\lambda_3 = 4$	-11-	1	
		$\lambda_4 = 0$	-11-	2	

Till varje egenvärde λ_i hör ett egenrum, alltså nollrummet till matrisen $\lambda_i I - A$. Dimensionen för detta egenrum är den geometriska multipliciteten för egenvärdet λ_i .

Sats Den geometriska mult. är alltid mindre än eller lika med den algebraiska mult.

Exempel. Vi såg tidigare att $A = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ uppfyllde $\det(\lambda I - A) = (\lambda - 2)^2$. De enda egenvektorer var multiplar av vektorn $(-3, 1)$. Alltså är den alg. mult. lika med 2, medan den geom. mult. är lika med 1

2 = graden på $(\lambda - 2)^2$
1 = dimensionen på nollrummet.

Sats En matris är diagonaliserbar precis då alg. mult. = geom. mult. för varje egenvärde,