

**Inlämningsuppgift för Matematisk Analys, fortsättningskurs,  
5B1304.**

Kan inlämnas antingen till kursledaren i samband med undervisningen eller i institutionens brevlåda i Klocktornet (Lindstedtsvägen 25). Ange alltid personnummer, namn. Om Du lägger uppgiften i institutionens brevlåda, så måste Du också ange kursledaren som adressat.

Som förberedelse för detta problem är det bra att läsa igenom stycke 11.11 i kursboken om Laplaceoperatoren i cylindriska och sfäriska koordinater.


**Problemet**

Om ett homogent värmeledande klot uppvärms genom att dess yta på höjden  $z$  [m] över horisontalplanet hålls på temperaturen  $f(z)$  [ $^{\circ}\text{C}$ ], så kommer värmen i klotet att stabilisera sig vid ett stationärt värmetilstånd då lång tid får passera. Detta stationära värmetilstånd är rotationssymmetriskt kring klotets lodräta diameter.

Man kan visa att temperaturen i en vertikal genomskärning av klotet i en godtycklig punkt ges av en funktion av typen

$$u(r, \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos \varphi),$$

där  $r$  och  $\varphi$  är de polära koordinaterna för punkten enligt figuren här bredvid,  $P_n$  är Legendrepolynomet av ordning  $n$  och  $A_n, n = 0, 1, \dots$ , är en följd konstanter.



Nu till *uppgiften*:

- a. En temperaturfördelning beskrivs av lösningar till värmeledningsekvationen. Vilka förenklande antaganden leder till lösningarna  $u(r, \varphi)$  ovan? Vilken differentialekvation (i bara  $r$  och  $\varphi$ ) löser dessa funktioner  $u(r, \varphi)$ ?
- b. Visa hur konstanterna  $A_n, n = 0, 1, \dots$ , beräknas ur  $f(z)$  och klotets radie  $R$  [m].
- c. Låt  $R = 1$  och  $f(z) = z^a \sin(b\pi z)$ , där  
 $a =$  (resten som de första sex siffrorna (ååmmdd) av Ditt tiosiffriga personnummer ger vid division med 7) +1 och  
 $b =$  (resten som de sista fyra siffrorna av Ditt tiosiffriga personnummer ger vid division med 7) +1. †  
 Rita med hjälp av något grafhjälpmedel (Maple, Matlab) upp minst 20 isotermer för temperaturen i ett lodplanet genom klotets medelpunkt.

† Skulle Du sakna personnummer eller ha ett som innehåller någon bokstav väljer Du  $a = 2$  och  $b = 5$ .

*Anmärkning:* För att få en uppfattning om hur man lämpligen trunkerar den oändliga serien kan man grafiskt testa hur väl

$$\sum_{n=0}^N A_n P_n(\cos \varphi) = [z = \cos \varphi \text{ på periferin}] = \sum_{n=0}^N A_n P_n(z)$$

för olika  $N$  överensstämmer med  $f(z)$ .

### Några intressanta Maplekommandon

<code>int(F(x), x=a..b);</code>	Beräknar (om möjligt) $\int_a^b F(x) dx$
<code>sum(F(n), n=a..b);</code>	Beräknar $\sum_{n=a}^b F(n)$ , $a$ och $b$ måste vara heltal.
<code>evalf(a);</code>	Beräknar närmevärde (i standardinställning med 10 siffror) till $a$ , som måste vara ett tal.
<code>Digits:= N;</code>	Alla närmevärdesberäkningar görs med $N$ siffror.
<code>with(orthopoly);</code>	Laddar bl a in Legendrepolyomen.
<code>with(plots);</code>	Laddar in extra plotrutiner, bl a för ritning av nivåkurvor.
<code>P(n, x)</code>	Legendrepolyomet $P_n(x)$ .
<code>plot(F(x), x=a..b);</code>	Plottar grafen för $F(x)$ i intervallet $a \leq x \leq b$ .
<code>contourplot([r*sin(phi), r*cos(phi), u(r, phi)], r=a..b, phi=c..d, contours=n);</code>	Ritar $n$ st. nivåkurvor för den funktion som i polära koordinater ges av $u(r, \varphi)$ , $a \leq r \leq b$ , $c \leq \varphi \leq d$ .